

Centril

Comprimidos 50 mg

Uso Veterinário

Dose única para cães e gatos

Fórmula:

Cada comprimido de 120 mg contém:

Enrofloxacin (base) 50 mg

Excipiente q.s.p. 120 mg

Indicações:

Centril Comprimidos 50 mg é indicado para cães e gatos, nas infecções causadas por bactérias, tanto nas Gram-positivas como nas Gram-negativas, micoplasmas e espiroquetas sensíveis ao princípio ativo, tais como:

- Infecções respiratórias (pneumonias) causadas por *Pasteurella spp.*, *Escherichia coli*, *Streptococcus spp.*, *Klebsiella spp.*, *Bordetella bronchiseptica*, *Staphylococcus aureus*, *Pseudomonas spp.* e *Mycoplasma spp.*;

- Piodermites causadas por *Staphylococcus intermedius*, *S. aureus*, *S. epidermidis*, *E. coli*, *Pseudomonas spp.* e *Proteus mirabilis*;

- Infecções genitourinárias causadas por *E. coli*, *Staphylococcus spp.*, *Proteus spp.*, *Streptococcus spp.*, *Pseudomonas spp.*, *Enterobacter spp.*, *Bruceella spp.*, *Mycoplasma spp.* e *Klebsiella spp.*;

- Diarréias causadas por *E. coli*, *Campylobacter spp.* e *Salmonella spp.*;

- Otitites causadas por *Pseudomonas spp.*, *Staphylococcus spp.*, *Streptococcus spp.* e *Proteus spp.*;

- Também atua como preventivo nas infecções causadas por lesões acidentais e no pós-cirúrgico.

Posologia e modo de usar:

Centril Comprimidos 50 mg deve ser administrado por via oral, para cães e gatos, puro ou misturado à ração, nas seguintes doses: 5 mg de Enrofloxacin por kg de peso corporal, ou seja, 1 comprimido de 50 mg para cada 10 kg de peso, a cada 24 horas, durante 5 dias.

Continuar o tratamento por um período nunca inferior a 48 horas, após o desaparecimento dos sintomas.

Contraindicações:

O produto é contra-indicado em caso de animais hipersensíveis aos componentes da fórmula.

A droga deverá ser utilizada com reserva em cães durante a fase de crescimento rápido: raças pequenas e médias, entre 2 e 8 meses de idade e raças grandes até os 18 meses. Isso porque, embora esporadicamente, poderá causar prejuízo à formação das articulações.

Para gatos o Enrofloxacin somente deve ser aplicado após o animal atingir 2 meses de idade. Não utilizar em animais prenhes e ainda, com insuficiência renal.

Precauções:

Produtos veterinários devem ser mantidos fora do alcance de crianças e animais domésticos e não devem ser armazenados junto de alimentos, bebidas e produtos de higiene pessoal.

- Conservar em local seco e fresco (até 25°C), ao abrigo da luz solar direta.

- Venda sob prescrição do Médico Veterinário.

Interações medicamentosas:

Não associar o produto com tetraciclina, macrolídeos, teofilina, sulfá + trimetopim e rifampina em virtude das propriedades antagônicas destas drogas. Não administrar este produto em conjunto com soluções contendo alumínio, cobre, ferro, zinco, magnésio e cálcio sob risco de reduzir a absorção de enrofloxacin.

Apresentação: Cartucho contendo blister com 10 comprimidos e display contendo 10 blisters com 10 comprimidos cada.

Responsável Técnico:

Dra. Larissa Arantes Mendonça - CRF-SP 53482.

Licenciado no Ministério da Agricultura sob nº 8.697 em 04/09/03

Fabricante:

Althaia S.A. Indústria Farmacêutica
Av.: Engenheiro Heitor A.E. Garcia, nº 2.756
Jd. Maria Luiza - São Paulo - SP
CNPJ 48.344.725/0001-23

Proprietário:



Centagro - Centro Tecnológico Agropecuário Ltda.
Rua Prudente de Moraes, 157 - Batatais - SP
CEP 14300-000 Fone: (16) 3660-3300
www.centagro.com.br
CNPJ: 23.793.946/0001-58
Indústria Brasileira



Atendimento ao Consumidor
0800 9410060



Centril

Tablets 50 mg

Veterinary Use

Single dose for dogs and cats

Formula :

Each 120 mg tablet contains :

Enrofloxacin (base) 50 mg

Q.s.p excipient 120 mg

Indications :

Centril tablets 50 mg is indicated for dogs and cats , in infections caused by bacteria , in both Gram - positive and gram-negative , mycoplasma and spirochetes sensitive to the active princi, such as:

- Respiratory infections (pneumonia) caused by Pasteurella spp., Escherichia coil , Streptococcus spp ., Kiebsiella spp., Bordetella bronchiseptica, Staphylococcus aureus , Pseudomonas spp . and Mycoplasma spp.;

- pyoderma caused by Staphylococcus intermedius, S. aureus , S. epidermidis , E. coil , Pseudomonas spp . and Proteus miriabilis;

- genitourinary infections caused by E. coil, Staphylococcus spp., Proteus spp., Streptococcus spp., Pseudomonas spp., Enterobacter spp., Brucela spp. , Mycoplasma spp. and Kle bisiella spp.

- Diarrhea caused by E. coil, Campylobacter spp. and Salmonella spp.

- Otitis caused by Pseudomonas spp . , Staphylococcus spp . , Streptococcus spp . and Proteus spp.

- Also acts as preventive in infections caused by accidental and impairment post surgical

Dosage and usage:

Centril 50 mg Tablets should be administered orally for dogs and cats , pure or mixed to the ration at the following doses :

Enrofloxacin 5 mg per kg of body weight that is 1 tablet 50 mg per 10 kg body weight every 24 hours for 5 days. Continue treatment for a period of not less than 48 hours , after the disappearance of symptoms.

Contraindications :

The product is contraindicated in the case of animals hypersensitive to the components of the formula . The drug is used on dogs during the rapid growing phase : small and medium breeds , between 2 and 8 months of age and big breeds until 18 months old. That is because, although sporadically , may cause harm to the formation of the articulations .

For cats the Enrofloxacin should only be applied after the animal reaches 2 months of age . Do not use in pregnant animals and still with renal failure .

Precautions :

Veterinary products should be kept out of reach of children and pets and should not be stored with food , drinks and toiletries .

- Keep in a dry and cool place (up to 25°C) , protected from direct sunlight .

- Sold under the veterinarian's prescription.

Medicine Interactions:

Do not associate the product with tetracycline, macrolide antibiotics, theophylline, rifampin and sulfa + trimetopirn because of antagonistic properties of these drugs. Do not use this product together with solutions containing aluminum, copper, iron, zinc, magnesium and calcium under risk of reducing absorption of enrofloxacin

Presentation: Box containing 10 tablets blister and display containing

10 blisters containing 10 tablets each.

Responsible Technician:

Dra. Larissa Arantes Mendonça -CRF-SP 53482.

Licensed by the Ministry of Agriculture under n° 8697 on 09/04/03

Manufacturer:

Althaia SA Industry Farmacêutica

Av: Engineer Heitor A.E. Garcia, in 2756 Jd. Maria Luiza - São Paulo - SP

CNPJ 48.344.725/0001-23


Owner:



Centagro - Agricultural Technology Center LTDA
157, Prudente de Morais St. - Batatais-SP - Brazil
ZIP: 14300-000 Phone: +55 (16) 3660 3300

www.centagro.com.br

CNPJ: 23.793.946/0001-58

Made in Brazil 

Information

centagro@centagro.com.br



Centril

Comprimidos 50 mg

Uso Veterinário

Dosis única para perros y gatos

Fórmula:

Cada tableta de 120 mg contiene:

Enrofloxacin (base) 50 mg

C.s.p. Excipiente 120 mg

Indicaciones:

Centril comprimidos 50 mg está indicado para perros y gatos en las infecciones causadas por bacterias, tanto en las gran-positivas como en las gran-negativas, micoplasmas y espiroquetas sensibles al ingrediente activo, tales como:

- Las infecciones respiratorias (pulmonías) causadas por *Pasteurella spp.*, *Escherichia coli*, *Streptococcus spp.*, *Klebsiella spp.*, *Bordetella bronchiseptica*, *Staphylococcus aureus*, *Pseudomonas spp.* y *Mycoplasma spp.*
- Piodermis causadas por *Staphylococcus intermedius*, *S. aureus*, *S. epidermidis*, *E. coli* *Pseudomonas spp.* y *Proteus mirabilis*;
- Infecciones genitourinarias causadas por *E. coli* *Staphylococcus spp.*, *Proteus spp.* *Streptococcus spp.*, *Pseudomonas spp.* *Enterobacter spp.*, *Brucella spp.*, *Mycoplasma spp.* y *Klebsiella spp.*
- Diarreas causadas por *E. coli*, *Campylobacter spp.* y *Salmonella spp.*
- Otitis causadas por *Pseudomonas spp.* *Staphylococcus spp.*, *Streptococcus spp.* y *Proteus spp.*
- También actúa como un preventivo para las infecciones causada por una lesión accidental y póscirúrgico.

Posología y modo de uso:

Centril 50mg comprimidos debe ser administrado por vía oral a perros y gatos, puro o mezclado con el alimento, las siguientes dosis: 5 mg de Enrofloxacin por kg de peso corporal, o sea 1 comprimido de 50 mg para cada 10 kg de peso, cada 24 horas durante 5 días. Continuar el tratamiento durante un período no menos de 48 horas después de la desaparición de los síntomas.

Contraindicaciones:

El producto está contraindicado en el caso de los animales hipersensibles a los componentes de la fórmula.

El medicamento debe ser utilizado con reserva en perros en fase de crecimiento rápido: razas pequeñas y medianas, de entre 2 y 8 meses de edad y razas grandes hasta los 18 meses. Esto es necesario porque, aunque de forma esporádica, puede ser perjudicial para la formación de las juntas. Para los gatos el enrofloxacin sólo debe

ser aplicado después de que se llega a los 2 meses de edad. No usar en animales en gestación e incluso con insuficiencia renal.causar prejuízo à formação das articulações.

Precauciones:

Productos veterinarios deben mantenerse fuera del alcance de los niños y las mascotas y no deben ser almacenados con los alimentos, bebidas y artículos de higiene.

- Conservar en lugar fresco y seco (hasta 25 ° C), protegido de la luz solar directa.
- Venta bajo prescripción del médico veterinario.

Interacciones medicamentosas:

No asociar el producto con tetraciclinas, macrólidos, teofilina, trimetoprim sulfá y + rifampicina en virtud de las propiedades antagonistas de estas fórmulas. No administrar este producto junto con soluciones que contienen aluminio, cobre, hierro, zinc, magnesio y calcio bajo riesgo de reducir la absorción de enrofloxacin.

Presentación: Caja con blíster con 10 comprimidos y display con 10 blisters con 10 comprimidos cada uno

Técnico Responsable:

Dra. Larissa Arantes Mendonça -CRF-SP 53482.

Licenciado en el Ministerio de Agricultura bajo el n ° 8983 de 22/10/04

Fabricante:

Althaia S.A. Indústria Farmacéutica
Av.: Engenheiro Heitor A.E. Garcia, n° 2.756
Jd. Maria Luiza - São Paulo - SP
CNPJ 48.344.725/0001-23

Proprietario:



Centragro - Centro Tecnológico Agropecuario Ltda.

Rua Prudente de Moraes, 157 - Batatais - SP

CEP 14300-000 Telefone:+55 (16) 3660-3300

www.centragro.com.br

CNPJ: 23.793.946/0001-58

Indústria Brasileira

Información

centragro@centragro.com.br

