

Notick

Uso Veterinário

Carrapaticida, Sarnicida e Piolhicida

Fórmula:

Cada 100 mL contém:

Amiltraz 12,5 g

Veículo q.s.p 100,000 mL

Indicações:

Em bovinos, tratamento e controle das infestações por carrapatos (*Boophilus microplus*, *Amblyomma spp.*, *Anocentor spp.*, etc.) e sarnas (*Sarcoptes scabiei* var. *Bovis*, *Sarcoptes communis* var. *bovis*, *Chorioptes bovis*).

Em caprinos, tratamento e controle das principais sarnas (*Sarcoptes spp.*, *Psoroptes spp.*).

Em ovinos, tratamento e controle das sarnas (*Psoroptes communis* var. *ovis*) e piolhos (*Linognathus spp.*, *Damalinea spp.*, *Melophagus spp.*, etc.).

Em suínos, tratamento e controle dos piolhos (*Haematopinus suis*), sarnas (*Sarcoptes scabiei* var. *suis*). Em cães tratamento e controle das sarnas demodécica, sarcóptica e notoédrica (*Demodex canis* e *Sarcoptes scabiei*, *Notoedres spp.*), carrapatos (*Rhipicephalus sanguineus*) e piolhos (*Trichodectes spp.*).

Posologia:

Para Bovinos:

Diluir 40 mL de Notick em 20 Litros de água, ou seja, 2 mL para cada Litro de água.

Para Ovinos, Caprinos e Suínos:

Diluir 80 mL de Notick em 20 Litros de água, ou seja, o dobro da dose recomendada para bovinos.

Bovinos		Caprinos, Ovinos e Suínos	
Notick (mL)	Água (litros)	Notick (mL)	Água (litros)
40	20	40	10
80	40	80	20
100	50	100	25
200	100	200	50
500	250	500	125
1000	500	1000	250
2000	1000	2000	500

Para Cães:

- Sarna demodécica e sarcóptica: diluir 4 mL de Notick para cada 1 Litro de água.

- Carrapatos e piolhos: diluir 2 mL de Notick para cada 1 Litro de água.

Modo de usar:

Diluir o produto somente no momento da aplicação e não estocar a calda. Se utilizar pulverizador manual ou

automático tomar cuidado para que o jato tenha bastante pressão e penetre sob o pelo do animal. Assegurar-se que todas as partes do animal (inclusive as axilas, cauda, interior das orelhas, etc.) sejam bastante molhadas.

Em Cães:

-Sarnas demodécicas e sarcópticas: Recomenda-se um banho com água e sabão neutro, antes da aplicação de Notick, para retirada de sujeiras e crostas. Após o banho, secar o animal e, com o pelo seco, aplicar a solução esfregando bem para que o produto penetre através dos pelos. Durante a aplicação do produto, cuidar para que o animal não se lamba. Deixar o animal secar naturalmente, em local abrigado do frio e calor.

-Carrapatos: Banhar o animal com o produto preparado, não havendo a necessidade de banho prévio, exceto em casos em que o animal esteja extremamente sujo.

Em cães de pelos longos e muito embaraçados uma tosa é recomendada.

Retirar o excesso de produto com uma toalha ou pano limpo e deixar secar naturalmente. Não utilizar secador nesta etapa.

Realizar junto com o tratamento do animal o tratamento do ambiente em que ele vive, lavando cuidadosamente a casinha ou canil, trocar a cama do animal, roupas, panos, cobertores, etc. Neste caso, recomenda-se a diluição de 2 mL de Notick por Litro de água para pulverização das paredes, pisos, frestas, telhados e outros locais que possam servir de abrigo a estes parasitos.

Intervalo entre as aplicações:

-Sarnas demodécicas e sarcópticas Repetir o tratamento em intervalos semanais, até o desaparecimento das lesões ou a critério do Médico Veterinário.

-Carrapatos: Repetir o tratamento sempre que necessário ou conforme recomendação do Médico Veterinário responsável.

Precauções:

Para bovinos, ovinos, caprinos e suínos:

-Não tratar animais cansados ou não horas mais quentes do dia, ou ainda, em dias chuvosos.

-Não abater animais para consumo antes de decorridos 14 dias da última aplicação

-Descartar o leite, destinado ao consumo humano, oriundo de animais tratados durante 48 horas após o último tratamento.

-Não tratar animais em adiantada fase de gestação.

-As áreas atingidas, no aplicador, pelo produto devem ser lavadas várias vezes com água e sabão em abundância.

-Não pulverizar os animais contra o vento e nem utilizar pulverizadores com vazamento.

Para Cães:

O tratamento de cadelas prenhes, em lactação ou filhotes com menos de 4 meses de idade não é recomendado e, quando necessário, deve ser criteriosamente avaliado pelo Médico Veterinário responsável.

Atenção:

-Não reutilizar as embalagens vazias para quaisquer fins.

-Utilizar luvas impermeáveis para tratamento dos animais, evitando o contato do produto com a pele.

Caso isto ocorra, lavar abundantemente com água e sabão.

-Não exercitar o animal antes da aplicação e oferecer bastante água.

-Evitar o contato do produto com os olhos e evitar que o mesmo seja ingerido pelo animal.

-Aplicar o produto à sombra, com o pelo seco, em caso de banho prévio secar bem a pelagem antes do tratamento.

-Preparar a diluição somente no momento da aplicação.

-Manter o produto fora do alcance de crianças e animais domésticos e ao abrigo do fogo.

-Manter o produto em local seco, fresco (entre 15°C e 30°C) e ao abrigo da luz solar.

-Para evitar reinfestações e controlar efetivamente estes parasitos é importante realizar o tratamento do ambiente onde vivem os cães, usando produtos adequados para este fim.

-Em caso de suspeita de intoxicação procure um Médico imediatamente. Nos casos de ingestão acidental, provocar

vômito, administrando por via oral uma colher de sopa de sal comum, dissolvida em um copo de água morna.

-Não comer, beber ou fumar durante a aplicação do produto.

Antídoto e tratamento:

Não se conhece antídoto específico para o Amiltraz. Sinais clínicos tais como depressão no sistema nervoso central, depressão respiratória, hipertensão, distúrbios digestivos, cefaléia, tremores, agitação e convulsões podem ser indicativos de intoxicação por formamidas. O tratamento deve ser analéptico sintomático.

Períodos de carência: Não abater os animais para o consumo humano antes de decorridos 14 dias da última aplicação do produto.

Descartar o leite das vacas tratadas destinado ao consumo humano, durante 48 horas após o último tratamento.

Venda sob prescrição e uso sob orientação do Médico Veterinário

Licenciado no Ministério da Agricultura sob n° 4.957 em 21/12/94

Responsável Técnico: Dra. Larissa Arantes Mendonça CRF-SP 53482.

Prazo de validade: 2 (dois) anos após a data da fabricação

Apresentação: frascos de vidro âmbar contendo 20 mL, 500 mL e 1000 mL e frasco plástico contendo 200 mL. Display contendo 15 frascos com 20 mL cada.

Cuidado  **Veneno**

Proprietário e Fabricante:

centagro

Centagro - Centro Tecnológico Agropecuário Ltda.
Rua Prudente de Moraes, 157 - Batatas - SP
CEP 14300-000 Fone: (14) 3660-3300
www.centagro.com.br
CNPJ: 23.793.946/0001-58
Indústria Brasileira

 **Atendimento ao Consumidor**
0800 9410060



Notick

Veterinary use

Tickicide, mangedicide and louseicide

formula:

Each 100 mL contains:

Amitraz 12.59

Vehicle q.s.p..... 100 000 mL

Indications:

In cattle , treatment and control of infestations by ticks (Boophilus microplus , Amblyomma spp . , Anocentor spp . , Etc. .) And mange (Sarcoptes scabiei var . Bovis , Sarcoptes communis var. Bovis , bovis Chorioptes .) .

In goats, treatment and control of major mange (Sarcoptes spp . , Psoroptes spp .) .

In sheep, treatment and control of mange (Psoroptes communis var. Ovis) and lice (Linognathus spp. Damalina spp. Melophagus spp. Etc.).

In pigs , treatment and control of lice (Haematopinus suis) , mange(Sarcoptes scabiei var . Suis) .

In dogs treatment and control of mange demodectic , sarcoptic and notoédrica (Demodex canis and Sarcoptes scabiei , Notoedres spp .) , Ticks (Rhipicephalus sanguineus) and lice (Trichodectes spp.).

Dosage:

For Cattle:

Dilute 40mL of Notick in 20 liters of water, that is 2 mL for liter of water.

For Sheep , Goats and Pigs: Dilute 80 mL of Notick in 20 Litres of water, that is twice the recommended dose for cattle .

cattle		Sheep, Goats And pigs	
Notick (mL)	Water (Liter)	Notick (mL)	Water (Liter)
40	20	40	10
80	40	80	20
100	50	100	25
200	100	200	50
500	250	500	125
1000	500	1000	250
2000	1000	2000	500

For Dogs :

- Demodectic mange and sarcoptic : dilute 4 mL of Notick for each 1 liter of water.

- Ticks and Lice: Dilute prepared by 2 mL Notick for each 1 liter of water.

Usage:

Dilute the product only at the time of application and do not store the syrup . If you use manual or automatic spray be sure that the jet has enough pressure and penetrate under the hair of the

animal . Ensure that all parts of the animal (including the armpits , tail , inside the ears , etc.) are quite wet .

In Dogs :

Demodécic and sarcoptic: mange

It is recommended a bath with plain soap and water before applying Notick , to remove dirt and scabs . After bathing , dry the animal and with the dry fur apply the solution so that the product penetrates through the fur. During the application of the product , take care that your pet does not lick it .

Let the animal dry naturally in a place sheltered from cold and heat .

- Ticks :

Bathe the animal with the prepared product, without the need for prior bath , except in cases where the animal is extremely dirty .

In dogs with long and very knotted fur trimming is recommended.

Remove excess of product with a towel or clean cloth and allow it to dry naturally.

Do not use dryer at this stage .

Perform along with the treatment of the animal, the treatment of the environment in where it lives , washings the doghouse or kennel carefully chance pet's bed clothing , cloths , blankets , etc. . In this case , it is recommended to dilute Notick 2 ml per liter of water for spraying the walls , floors , cracks , roofs and other places that can serve as shelter to these parasites .

Interval between applications: .

Demodectic and sarcoptic mange Repeat treatment at weekly intervals until the lesions disappear or at the discretion of the veterinarian .

- Ticks :

Repeat treatment whenever necessary or as a recommendation by the Veterinary responsible.

Precautions : For cattle , sheep, goats and pigs :

Do not treat tired animals or at the hottest hours of the day, or even on rainy days.

Do not slaughter animals for consumption sooner than 14 days from the last application

- Discard the milk intended for human consumption derived from animals

treated for 48 hours after the last treatment .

Do not treat animals in an advanced stage of pregnancy.

- The affected areas in the applicator , by the product should be washed several times with plenty of water and plenty of soap .

Do not spray the animals against the wind and do not use leaking sprays.

For Dogs:

The treatment of pregnant females in Lactation or puppies under 4 months of age is in recommended and , when necessary , should be carefully examined by the veterinarian responsible.

Attention:

Do not reuse empty containers for any purpose.

- Use waterproof gloves for handling the animals , avoiding contact of the product with the skin . If this occurs , wash thoroughly with soap and water .

Do not exercise your pet before application and provide plenty of water .

- Avoid contact of the product with the eyes and prevent it from being ingested by the animal.

Apply the product at the shade, with the dry fur in case dry of prior bath the fur well before the treatment.

- Prepare dilution only at the time of application.

- Keep the product out of the reach of children and pets and away from fire .

- Keep the product in a dry and cool place (15 ° C and 30 ° C) and away sunlight.

- To avoid reinfestation and effectively control these parasites is important to carry out the treatment of the environment where they dogs , live, using suitable products for this purpose .

- In case of suspicion of poisoning call a doctor immediately. In case of accidental ingestion, induce vomiting by

administering orally a tablespoon of salt dissolved in a glass of warm water .

Do not eat, drink or smoke during application of the product .

Antidote and treatment:

There is no known specific antidote for Amitraz . Clinical signs such as central nervous system depression , respiratory depression , hypertension , digestive disorders , headaches , trembling , agitation, and seizures may be indicative of poisoning formamidine .The treatment should be symptomatic analeptic.

Grace Periods:

Do not slaughter animals for human consumption earlier than 14 days from the last application of the product. Discarding milk from cows treated for human consumption , during 48 hours after the last treatment .

Sold under prescription and the supervision of the veterinarian

Licensed by the Ministry of Agriculture under n°4957 on 21/12/94

Responsible technician:

Dra. Larissa Arantes Mendonça CRF-SP 53482.

Due Date: two (2) years from date of manufacture

Presentation: amber glass bottles containing 20 ml , 500 ml and 1000 ml and containing 200 ml plastic bottle . Display containing 15 bottles of 20 mL each.

Owner and Manufacturer



Centagro - Agricultural Technology Center LTDA
157, Prudente de Moraes St. - Batatais-SP - Brazil
ZIP: 14300-000 Phone: +55 (16) 3660 3300
www.centagro.com.br
CNPJ: 23.793.946/0001-58
Made in Brazil

Information:
centagro@centagro.com.br



Notick

Uso Veterinario

Carrapaticida, Sarnicida e Piolhícida

Fórmula:

Cada 100 mL contiene:
Amitraz 12,5 g
Vehículo q.s.p 100,000 mL

Indicaciones

En el ganado vacuno, tratamiento y control de las infestaciones por garrapatas

(*Boophilus microplus*, *Amblyomma spp.*, *Anocentor spp.* etc) y sarnas (*Sarcoptes scabiei* var. *Bovis*, *Sarcoptes communis* var. *bovis*, *Chorioptes bovis*).

En cabras, tratamiento y control de las principales sarnas (*Sarcoptes spp.*, *Psoroptes spp.*).

En las ovejas, tratamiento y control de las sarnas (*Psoroptes communis* var. *ovis*) y piojos (*Linognathus spp.*, *Damalinia spp.*, *Melophagus spp.* etc) ..

En los cerdos, tratamiento y el control de los piojos

(*Haematopinus suis*), sarnas (*Sarcoptes scabiei* var. *Suis*).

En perros tratamiento y control de las sarnas demodélica, sarcopítica y notoédrica

(*Demodex canis* y *Sarcoptes scabiei*, *Notoedres spp.*) garrapatas (*Rhipicephalus sanguineus*) y piojos (*Trichodectes spp.*).

Posología:

Para ganado:

Diluir 40 mL de Notick en 20 Litros de agua, es decir, 2 mL para cada litro de agua.

Para ovejas, cabras y cerdos: Diluir 80 mL de Notick en 20 Litros de agua, es decir, el doble de la dosis recomendada para el ganado.

Ganados		Ovejas, Cabras y Cerdos	
Notick (mL)	Agua (litros)	Notick (mL)	Agua (litros)
40	20	40	10
80	40	80	20
100	50	100	25
200	100	200	50
500	250	500	125
1000	500	1000	250
2000	1000	2000	500

Para perros

- Sarna demodélica y sarcopítica: diluir 4 mL de Notick para cada 1 litro de agua.

- Garrapatas y piojos: diluir 2 mL de Notick para cada 1 litro de agua.

Modo de uso:

Diluir el producto sólo en el momento de la aplicación y no almacenar el jarabe. Si utiliza pulverizador manual o automático cuidado para que el

chorro tenga suficiente presión y penetre bajo el pelo del animal. Asegúrese de que todas las partes del animal (incluidos las axilas, cola, dentro de las orejas, etc) sean bastante mojadas.

En Perros:

-Sarnas demodélicas y sarcopíticas:
Se recomienda un baño con jabón suave y agua antes de la aplicación de Notick, para remoción de suciedades y costras. Después del baño, seque al animal y con el pelo seco, aplique la solución frotando bien para que el producto penetre a través de los pelos. Durante la aplicación del producto cuidar para que el animal no se lama. Deje el animal secar naturalmente, en lugar protegido de frío y calor.

-Garrapatas:

Lavar el animal con el producto preparado, no necesitando bañarlo antes, excepto en los casos en que el animal esté extremadamente sucio. En los perros de pelos largos y muy enredados se recomienda una tosa.

Retire el exceso de producto con una toalla o paño limpio y deje que se seque naturalmente. No utilice el secador en esta etapa.

Realizar junto al tratamiento del animal el tratamiento del ambiente en el que vive, lavando con mucho cuidado la casita o perrera, cambiar la cama del animal, ropas, telas, mantas, etc. En este caso, se recomienda la dilución de 2mL de Notick por litro de agua para la pulverización de las paredes, pisos, grietas, techos y otros lugares que puedan servir de abrigo a estos parásitos.

Intervalo entre aplicaciones:

-Sarnas demodélicas y sarcopíticas
Repita el tratamiento en intervalos semanales, hasta la desaparición de las lesiones o a criterio del veterinario.

-Garrapatas:

Repita el tratamiento si necesario o de acuerdo con la recomendación del Médico Veterinario.

Precauciones:

Para bovinos, ovinos, caprinos y porcinos:

-No trate animales cansados o en las horas más calurosas del día, o incluso en días de lluvia.
-No sacrifique animales para consumo antes de 14 de días después de la última aplicación
-Deseche la leche destinada al consumo humano procedente de animales tratados durante 48 horas después del último tratamiento.

-No tratar a los animales en etapa adelantada de gestación.
-Las áreas afectadas, en el aplicador, por el producto deben ser lavadas varias veces con agua y jabón en abundancia.

-No pulverice animales contra el viento ni tampoco utilice pulverizadores con escape.

Para los perros:

El tratamiento de perras preñadas, lactantes o cachorros con menos de 4 meses de edad no se recomienda y, cuando necesario, debe ser rigurosamente evaluado por un Veterinario responsable.

Atención:

No vuelva a usar los envases vacíos para cualquier propósito.
-Use guantes impermeables para tratamiento de los animales, evitando el contacto del producto con la piel.

-Evitar el contacto del producto con los ojos y evitar ser ingerido por el animal.

-No ejercitar el animal antes de la aplicación y ofrecerle bastante agua.

-Evitar el contacto del producto con los ojos y evitar ser ingerido por el animal.

-Aplicar el producto a la sombra, con el pelo seco, en caso de baño previo secar bien el pelaje antes del tratamiento.

-Preparar la dilución solo en el momento de la aplicación.

-Mantener el producto fuera del alcance de los niños y las mascotas y lejos del fuego.

-Mantener el producto en un lugar seco, fresco (entre 15 ° C y 30 ° C) y proteger de la luz solar.

-Para evitar la reinfección y controlar eficazmente estos parásitos es importante realizar el tratamiento del medio ambiente donde los perros viven, usando productos adecuados para este fin.

-En caso de sospecha de intoxicación consulte a un médico inmediatamente. En el caso ingestión accidental,

provoque Vómitos, administrando por vía oral una colher de sopa de sal comuna, dissolvida em um copo de água morna.

-Não comer, beber ou fumar durante a aplicação do produto.

Antídoto e tratamento:

Não se conhece antídoto específico para o Amitraz. Sinais clínicos tais como depressão no sistema nervoso central, depressão respiratória, hipertensão, distúrbios digestivos, cefaléia, tremores, agitação e convulsão podem ser indicativos de intoxicação por formamidas. O tratamento deve ser analéptico sintomático.

Períodos de carência:

Não abater os animais para o consumo humano antes de decorridos 14 dias da última aplicação do produto. Descartar o leite das vacas tratadas destinado ao consumo humano, durante 48 horas após o último tratamento.

Venda sob prescrição e uso sob orientação do Médico Veterinário

Licenciado no Ministério da Agricultura sob nº 4.957 em 21/12/94

Responsável Técnico:

Dra. Larissa Arantes Mendonça CRF-SP 53482.

Prazo de validade: 2 (dois) anos após a data da fabricação

Apresentação: frascos de vidro âmbar contendo 20 mL, 500 mL e 1000 mL e frasco plástico contendo 200 mL. Display contendo 15 frascos com 20 mL cada.

Cuidado  Veneno

Proprietário y Fabricante:



Centagro - Centro Tecnológico Agropecuario Ltda.
Rua Prudente de Moraes, 157 - Batatais - SP
CEP 14300-000 Telefone: (16) 3646-3300
www.centagro.com.br
CNPJ: 23.793.946/0001-58
Indústria Brasileira 

Información
centagro@centagro.com.br

