

Produto medicinal a base de
piretróide (cipermetrina) utilizado
no tratamento e controle de pulgas, piolhos
e carrapatos. Auxilia no tratamento de sarnas.

Fórmula:

Cada 100 ml contém:

Cipermetrina.....0,20 g

Butóxido de piperonila.....1,00 g

Veículo q.s.p.....100 ml

Indicações:

XANDOG apresenta excelente ação contra todos parasitos externos que infestam cães e gatos, como pulgas (*Ctenocephalides canis* e *C. Felis*), carrapatos (*Rhipicephalus sanguineus*), piolhos (*Trichodectes canis*), e auxilia também no tratamento e controle das infestações por sarnas (*Sarcoptes spp.*, *Psoroptes spp.* e *Demodex spp.*).

Possui em sua formulação 2 compostos (cipermetrina e butóxido de piperonila) que atuam sinergicamente, potencializando seu efeito contra os ectoparasitos (pulgas, piolhos e carrapatos). Devido a ação repelente da cipermetrina, evita a aproximação de moscas e parasitas.

Substitui os odores característicos do animal por um suave e discreto perfume.

Posologia e modo de usar:

Uso tópico. Sobre a pelagem molhada do animal, aplicar **XANDOG** na região da cabeça em direção a cauda, evitando a fuga dos ectoparasitos (pulgas, carrapatos e piolhos) da cauda para a cabeça. A seguir, esfregar e revolver o pelo do animal, até a obtenção de espuma abundante, permitindo perfeito contato do produto com a pele do animal. Deixar agir por 10 minutos, enxaguar bem e repetir a operação. Retirar o excesso de água com uma toalha ou pano limpo e seco, proceder a escovação e deixar o animal secar naturalmente. **XANDOG** deve ser aplicado sempre que se banhar o animal para obter um perfeito controle das infestações por estes parasitos.

Precauções:

Não usar o produto simultaneamente com outros a base de piretróides devido a toxicidade cumulativa. Todo produto com ação inseticida, deve ser manipulado e armazenado com cuidado independente do seu grau de toxidade. Manter fora do alcance das crianças e dos animais domésticos. Não armazenar o produto perto de alimentos, bebidas, materiais de higiene e cosméticos. Não fumar, beber ou comer durante sua aplicação. Não reutilizar as embalagens vazias, enterrar longe de mananciais, rios e lagos. Evitar que durante o banho o produto alcance os olhos, narinas e boca do animal. Caso isto ocorra, lave com água corrente por 15 minutos. Utilizar luvas de borracha durante a aplicação do produto, evitando contato direto com o mesmo. Em caso de acidente com o homem chamar imediatamente um médico. Produto tóxico para peixes, abelhas e pássaros. Conservar em local fresco, entre 14° C e 38°C, seco, ao abrigo da luz solar.

Atenção:

Não há antídoto para os derivados piretróides. Portanto, proceder o tratamento sintomático no caso de envenenamento. Para evitar reinfestações e controlar efetivamente os ectoparasitos é importante tratar também o ambiente onde vivem os cães e gatos, usando produtos adequados para este fim.

Apresentação:

Frascos plásticos contendo 240 ml, 400 ml e 5 l.

Venda sob prescrição do Médico Veterinário.

Responsável Técnico: Dra. Larissa Arantes Mendonça -CRF-SP53482.

Licenciado no Ministério da Agricultura sob nº 5012 em 15/02/95

Proprietário e Fabricante:

CENTAGRO - Centro Tecnológico Agropecuário Ltda.

Rua Prudente de Moraes, 157

CEP 14300-000 - Batatais, SP

PABX (16) 3660-3300

CNPJ: 23.793.946/0001-58

Indústria Brasileira 

www.centagro.com.br



7 897455 100576

Serviço de Atendimento
ao Consumidor

0800 941 0060

Medicinal product pyrethroid (cypermethrin) base
Used in the treatment and control of fleas, lice
and ticks. Helps in the treatment of scabies.

Formula

Each 100 ml contains:

Cypermethrin 0.20 g
Piperonyl butoxide..... 1.00 g
Vehicle q.s.p.....100ml

Indications:

XANDOG presents excellent action against all external parasites which infest dogs and cats, as fleas (*Ctenocephalides canis* and *C. Felis*), ticks (*Rhipicephalus sanguineus*), lice (*Trichodectes canis*), and also helps in the treatment and control of infestations by scabies (*Sarcoptes* spp. *Psoroptes* spp. and *Demodex* spp.).

Its formulation contains 2 compounds (cypermethrin and piperonyl butoxide) which acts synergistically, enhancing its effect against ectoparasites (fleas, ticks and lice). Due to the repellent action of cypermethrin, prevents approximation of flies and parasites.

It replaces characteristic odors of the animal by a soft and discreet perfume.

Dosage and usage:

Topical use. On the animal's wet fur apply XANDOG in the region of the head toward the tail, preventing the escape of ectoparasites (fleas, ticks and lice) from the tail to the head. Then scrub and revolve the animal fur to get abundant foam, allowing perfect contact of the product with the animal's skin. Let it act for 10 minutes, rinse it well and repeat the operation. Remove excess water with a towel or a clean dry cloth, brush it and let the animal to dry naturally. XANDOG should be applied when ever bathing the pet to get perfect control of infestations by these parasites.

Precautions:

Do not use the product simultaneously with other stored base pyrethroids due to cumulative toxicity. Every product with insecticide action must be handled and stored carefully and regardless of their level of toxicity. Keep out of reach of children and pets. Do not store product near food, beverages, sanitary products and cosmetics products. Do not smoke, drink or eat during application. Do not reuse empty containers, bury away from springs, rivers and lakes. Do not let the product reaches the eyes, nose and mouth of the animal. If this happens, wash with running water for 15 minutes. Use rubber gloves during application of the product, avoiding direct contact. In case of accident with man call a doctor immediately. Toxic product for fish, bees and birds. Keep in a cool place, between 14 °C and 38 °C, dry place, away from sunlight.

Attention:

There is no antidote for pyrethroids derivatives. So make the symptomatic treatment in case of poisoning. To avoid reinfestation and control the ectoparasites effectively it is important to treat the environment where the dogs and cats live using suitable products for this purpose.

Presentation:

Plastics bottles containing 240 ml, 400 ml and 5 L.

Sold under prescription of the veterinarian

Responsible technician:

Dra. Larissa Arantes Mendonça -CRF-SP 53482.

Owner and Manufacturer

Centagro - Agricultural Technology Center LTDA
157, Prudente de Morais St. - Batatais-SP - Brazil
ZIP: 14300-000 Phone: +55 (16) 3660 3300
www.centagro.com.br
CNPJ: 23.793.946/0001-58
Made in Brazil 



Information:
centagro@centagro.com.br

Producto medicinal a base de piretroide (cipermetrina) utilizado en el tratamiento y control de pulgas, piojos y garrapatas. Auxilia en el tratamiento de sarnas

Fórmula:

Cada 100 ml contiene:

Cipermetrina.....0,20 g

Butoxido de piperonila.....1,00 g

Vehículoq.s.p.....100 ml

Indicaciones:

XANDOG presenta excelente acción contra todos los parásitos externos que infestan a los perros y gatos, como las pulgas (*Ctenocephalides canis* y *C. felis*), garrapatas (*Rhipicephalus sanguineus*), piojos (*Trichodectes canis*), y también ayuda en el tratamiento y control de infestaciones por sarna (*Sarcoptes spp.* *Psoroptes spp.* y *Demodex spp.*).

Posee en su formulación 2 compuestos (cipermetrina y butóxido de piperonila) que actúan de forma sinérgica, potenciando su efecto contra ectoparásitos (pulgas, piojos y garrapatas). Debido a la acción repelente de cipermetrina, evita la aproximación de las moscas y parásitos.

Sustituye los olores característicos de los animales por un perfume suave y discreto.

Posología y modo de uso:

Uso tópico. Sobre el pelaje húmedo del animal, aplique XANDOG en la región de la cabeza hacia la cola, impidiendo el escape de ectoparásitos (pulgas, garrapatas y piojos) de la cola a la cabeza. Luego, frote y revuelva el pelo del animal para obtener abundante espuma, permitiendo el perfecto contacto del producto con la piel del animal. Déjelo por 10 minutos, enjuague bien y repita la operación.

Retire el exceso de agua con una toalla o un paño limpio y seco, haga el cepillado y deje que el animal se seque naturalmente. XANDOG debe ser aplicado cada vez que se bañe al animal para obtener un perfecto control de las infestaciones por estos parásitos.

Precauciones:

No utilice el producto simultáneamente con otros a base de piretroides debido a la toxicidad acumulativa. Cada producto con acción insecticida debe ser manipulado y almacenado con cuidado independientemente de su nivel de toxicidad. Mantener fuera del alcance de los niños y las mascotas. No almacene este producto cerca de alimentos, bebidas, cosméticos y artículos de higiene. No fumar, beber o comer durante la aplicación. No vuelva a usar los recipientes vacíos, enterrar lejos de las fuentes de agua, ríos y lagos. Evitar que durante el baño el producto alcance a los ojos, la nariz y la boca del animal. Si esto ocurre, enjuáguelos con agua durante 15 minutos. Utilizar guantes de goma durante la aplicación del producto, evitando el contacto directo con él. En caso de accidente con el hombre acuda a un médico inmediatamente. Producto tóxico para peces, abejas y aves. Mantenga en un lugar fresco, entre 14 ° C y 38 ° C, seco y alejado de la luz solar.

Atención:

No existe un antídoto para los derivados piretroides. Por lo tanto, proceder el tratamiento sintomático en caso de envenenamiento. Para prevenir la re-infestación y el control efectivo de ectoparásitos es importante tratar también el medio ambiente en el que viven los perros y gatos, usando productos adecuados para este fin.



Presentación

Botellas de plástico con 240 ml, 400 ml y 5 l.

Venta bajo prescripción del médico veterinario.

Técnico responsable: Dra. Larissa Arantes Mendonça -CRF-SP53482.

Licenciado en el Ministerio de Agricultura bajo n ° 5012 de 15/02/95

CENTAGRO - Centro Tecnológico Agropecuario Ltda.

Rua Prudente de Moraes, 157
CEP 14300-000 - Batatais, SP
Teléfono: +55 (16) 3660-3300
CNPJ: 23.793.946/0001-58
Indústria Brasileira



www.centagro.com.br



7 897455 100576

Information
centagro@centagro.com.br